


రండి మనమందరం టీబి కి వ్యతిరేకంగా పోరాడుదాం

- ❖ భారతదేశంలో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని మిలియన్లలు మంది టీజి బాలిన పడుతూ మరణిస్తున్నారు.
- ❖ టీజి తో బాధపడుతున్న ఒక వ్యక్తి తన ముఖాన్ని దాచుకోకుండ దగ్గినా లేక తుమ్మినా, ఎక్కడపడితే అక్కడ ఉమ్మి వేసినా టీజి వ్యాధి వ్యాపిస్తుంది.
- ❖ టీజిని కలుగగచేసే బ్యాక్టీరియా గాలి ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. ఈ గాలిని పీల్చే ఇతర వ్యక్తికి టీజిని సంక్రమింపచేస్తుంది.

- దగ్గ (3 వారాల కంటే ఎక్కువ)
- దగ్గినపుడు గళ్ళతో పాటు రక్తం పడటం
- ఛాతిలో నోప్పి
- బరువు తగ్గడం
- జ్వరం
- రాత్రి పూట చెముట పట్టడం
- ఆకలి లేకపోవడం



- ❖ పైన పేరీస్సు ఏ లక్షణాలైన మూడు వారాల కంటే ఎక్కువగా పున్నట్టుతే, ఆమె / ఆతడు దగ్గరలోని ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సందర్శించి, గళ్ళ పరీక్ష చేయించుకోవాలి.
- ❖ టీజి వ్యాధిని మందులతో పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు.
- ❖ అన్ని ఆరోగ్య కేంద్రాలలో DOTS చికిత్స ఉచితంగా లభ్యమవుతుంది.
- ❖ టీజి పున్న వ్యక్తి కనీసం 6 నెలల పాటు క్రమం తప్పకుండా మందులు తీసుకోవాలి. కొన్ని సందర్భాలలో ఈ మందులు ఒక సంవత్సరం వరకు వాడాలి. డాక్టరు సూచనల మేరకు మాత్రమే ఈ మందుల వాడకాన్ని నిలిపి వేయవచ్చు.
- ❖ HIV (హోచ్ ఐ ఐ) పున్న వారికి టీజి వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. HIV (హోచ్ ఐ ఐ) వలన వ్యాధి నిరీధక శక్తి బలహీనపడటంతో బ్యాక్టీరియా పెలిగి వ్యాధి చెందుతాయి. ఆ వ్యక్తి టీజి వలన తొందరగా మరణిస్తాడు.

గుర్తంచుకోవలసిన అంశాలు:

- మూడు వారాల కంటే ఎక్కువగా దగ్గ పున్నట్టయితే డాక్టరును తప్పక సంప్రదించండి.
- క్రమం తప్పకుండా నిర్దేశించినంత కాలం పాటు అన్ని మందులను తీసుకోవడం వలన టీజి వ్యాధిని నయం చేయవచ్చు.
- తుమ్మినపుడు లేదా దగ్గినపుడు చేతిగుర్దను ఉపయోగించాలి.
- ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉమ్మి వేయకూడదు.
- మీ డాక్టరు సూచించకముందే మందులను వాడటం నిలిపి వేయకూడదు.
- టీజి పేపింట్లను అంటరానివాలిగా చూడవద్దు.

ఈ వివరాలు డాక్టరు సూచనలకు బదులుగా వాడకూడదు. ఈ వివరాలు టీజి వ్యాధిని గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఇప్పటిదినవి. మీ ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి ఎల్లప్పుడూ డాక్టరును సంప్రదించండి.