



**Sentinel
Project**
on pediatric drug-
resistant tuberculosis

Stop TB Partnership
GLOBAL DRUG FACILITY

LÉVOFLOXACINE 100MG, COMPRIMÉ SÉCABLE, DISPERSIBLE

Dose recommandée: 15-20mg/kg/jour
Posologie selon le poids

Échelle de Poids (kg)	Dose (mg)	Nombre de comprimés de 100mg
1kg	20mg	Mélangez un comprimé de 100mg dans 10ml d'eau et administrez 2ml de la mixture immédiatement
2kg	40mg	Mélangez un comprimé de 100mg dans 10ml d'eau et administrez 4ml de la mixture immédiatement
3kg	50mg	0.5
4-6kg	100mg	1
7-9kg	150mg	1.5
10-12kg	250mg	2.0-2.5
13-15kg	300mg	3
16-18kg	350mg	3.0-3.5
19-20kg	400mg	4
21-23kg	450mg	4.0-4.5
24-25kg	500mg	5



**Sentinel
Project**
on pediatric drug-
resistant tuberculosis

Stop TB Partnership
GLOBAL DRUG FACILITY

MOXIFLOXACINE 100MG, COMPRIMÉ SÉCABLE, DISPERSIBLE

Dose recommandée: 10-15mg/kg/jour
Posologie selon le poids

Échelle de Poids (kg)	Dose (mg)	Nombre de comprimés de 100mg
1kg	10mg	Mélangez un comprimé de 100mg dans 10ml d'eau et administrez 1ml de la mixture immédiatement
2kg	20mg	Mélangez un comprimé de 100mg dans 10ml d'eau et administrez 2ml de la mixture immédiatement
3kg	30mg	Mélangez un comprimé de 100mg dans 10ml d'eau et administrez 3ml de la mixture immédiatement
4-6kg	50-80mg	0.50-0.75
7-9kg	150mg	1.5
10-15kg	200mg	2
16-19kg	300mg	3
20-25kg	400mg	4



**Sentinel
Project**
on pediatric drug-
resistant tuberculosis

Stop TB Partnership
GLOBAL DRUG FACILITY

CYCLOSÉRINE 125MG, CAPSULE

Dose recommandée: 10-15mg/kg/jour

Posologie selon le poids

Échelle de Poids (kg)	Dose (mg)	Nombre de capsules de 125mg
1kg	20mg	Mélangez une capsule de 125mg dans 12ml d'eau et administrez 1ml de la mixture immédiatement
2kg	40mg	Mélangez une capsule de 125mg dans 12ml d'eau et administrez 2ml de la mixture immédiatement
3-4kg	62.5mg	Mélangez une capsule de 125mg dans 12ml d'eau et administrez 5ml de la mixture immédiatement
5-9kg	125mg	1
10-15kg	250mg	2
16-23kg	375mg	3
24-25kg	500mg	4



**Sentinel
Project**
on pediatric drug-
resistant tuberculosis

Stop TB Partnership
GLOBAL DRUG FACILITY

ÉTHAMBUTOL 100MG, COMPRIMÉ SÉCABLE, DISPERSIBLE

Dose recommandée: 15-25mg/kg/jour
Posologie selon le poids

Échelle de Poids (kg)	Dose (mg)	Nombre de comprimés de 100mg
1kg	20mg	Mélangez un comprimé de 100mg dans 10ml d'eau et administrez 2ml de la mixture immédiatement
2kg	40mg	Mélangez un comprimé de 100mg dans 10ml d'eau et administrez 4ml de la mixture immédiatement
3kg	70mg	Mélangez un comprimé de 100mg dans 10ml d'eau et administrez 7ml de la mixture immédiatement
4-6kg	100mg	1
7-9kg	200mg	2
10-12kg	250mg	2.5
13-15kg	300mg	3
16-18kg	350 mg	3.5
19-20kg	400mg	4
21-23kg	450mg	4.5
24-25kg	500mg	5



**Sentinel
Project**
on pediatric drug-
resistant tuberculosis

Stop TB Partnership
GLOBAL DRUG FACILITY

PYRAZINDAMIDE 150MG, COMPRIMÉ SÉCABLE, DISPERSIBLE

Dose recommandée: 30-40mg/kg/jour
Posologie selon le poids

Échelle de Poids (kg)	Dose (mg)	Nombre de comprimés de 150mg
1kg	30mg	Mélangez un comprimé de 150mg dans 15ml d'eau et administrez 3ml de la mixture immédiatement
2kg	60mg	Mélangez un comprimé de 150mg dans 15ml d'eau et administrez 6ml de la mixture immédiatement
3kg	90mg	Mélangez un comprimé de 150mg dans 15ml d'eau et administrez 9ml de la mixture immédiatement
4-6kg	150mg	1
7-9kg	225-360mg	2
10-12kg	375mg	2.5
13-15kg	450mg	3
16-18kg	525mg	3.5
19-20kg	600mg	4
21-23kg	675mg	4.5
24-25kg	750mg	5



**Sentinel
Project**
on pediatric drug-
resistant tuberculosis

Stop TB Partnership
GLOBAL DRUG FACILITY

ÉTHIONAMIDE 125MG, COMPRIMÉ SÉCABLE, DISPERSIBLE

Dose recommandée: 15-20mg/kg/jour
Posologie selon le poids

Échelle de Poids (kg)	Dose (mg)	Nombre de comprimés de 125mg
1kg	20mg	Mélangez un comprimé de 125mg dans 12ml d'eau et administrez 1ml de la mixture immédiatement
2kg	40mg	Mélangez un comprimé de 125mg dans 12ml d'eau et administrez 2ml de la mixture immédiatement
3-4kg	62.5mg	0.5
5-6kg	125mg	1
7-9kg	187.5mg	1.5
10-13kg	250mg	2
14-15kg	312.5mg	2.5
16-20kg	375mg	3
21-23kg	437.5mg	3.5
24-25kg	500mg	4



**Sentinel
Project**
on pediatric drug-
resistant tuberculosis

Stop TB Partnership
GLOBAL DRUG FACILITY

ISONIAZIDE 100MG, COMPRIMÉ SÉCABLE, DISPERSIBLE

Dose recommandée: 15-20mg/kg/jour
Posologie selon le poids

Échelle de Poids (kg)	Dose (mg)	Nombre de comprimés de 100mg
1kg	15mg	Mélangez un comprimé de 100mg dans 10ml d'eau et administrez 1.5ml de la mixture immédiatement
2kg	30mg	Mélangez un comprimé de 100mg dans 10ml d'eau et administrez 3ml de la mixture immédiatement
3kg	50mg	0.5
4-6kg	100mg	1
7-9kg	150mg	1.5
10-15kg	200mg	2
16-18kg	250mg	2.5
19-20kg	300mg	3
21-23kg	350mg	3.5
24-25kg	400mg	4



**Sentinel
Project**
on pediatric drug-
resistant tuberculosis

Stop TB Partnership
GLOBAL DRUG FACILITY

CLOFAZIMINE 50MG, COMPRIMÉ

Dose recommandée: 2-5mg/kg/jour

Échelle de Poids (kg)	Dose (mg)	Nombre de comprimés de 50mg
<5kg	10-20mg	Faites dissoudre le comprimé dans 10ml d'eau pour obtenir une suspension de 5mg/ml et administrez la dose désirée. Ne pas conserver la suspension : préparez une nouvelle suspension chaque fois.
6-10kg	25mg	½
11-19 kg	50mg	1
20-25kg	100mg	2



**Sentinel
Project**
on pediatric drug-
resistant tuberculosis

Stop TB Partnership
GLOBAL DRUG FACILITY

PAS ENCORE DISPONIBLE

LINÉZOLIDE 150MG, COMPRIMÉ SÉCABLE, DISPERSIBLE

Dose recommandée :

10-12mg/kg une fois par jour pour les enfants < 12 ans pesant 16 kg ou plus;

15mg/kg une fois par jour pour les enfants < 12 ans pesant moins de 16 kg;

10mg/kg une fois par jour pour les enfants âgés de 12 ans et plus.

Échelle de Poids (kg)	Dose (mg)	Nombre de comprimés de 150mg
1kg	15mg deux fois par jour	Mélangez un comprimé de 150mg dans 15ml d'eau et administrez 1.5ml de la mixture immédiatement
2kg	30mg une fois par jour	Mélangez un comprimé de 150mg dans 15ml d'eau et administrez 3ml de la mixture immédiatement
3kg	45mg une fois par jour	Mélangez un comprimé de 150mg dans 15ml d'eau et administrez 4.5ml de la mixture immédiatement
4kg	60mg une fois par jour	Mélangez un comprimé de 150mg dans 15ml d'eau et administrez 6ml de la mixture immédiatement
5kg	75mg une fois par jour	Mélangez un comprimé de 150mg dans 15ml d'eau et administrez 7.5ml de la mixture immédiatement, ou administrez 0.5 d'un comprimé de 150mg
6kg	90mg une fois par jour	Mélangez un comprimé de 150mg dans 15ml d'eau et administrez 9ml de la mixture immédiatement
7-9kg	75-150mg une fois par jour	0.5-1.0
10-15kg	150-225mg une fois par jour	1.0-1.5
16-20kg	225-300mg une fois par jour	1.5-2.0
21-25kg	300mg une fois par jour	2